

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

Dovequa (rywaroksaban) 2,5 mg, tabletki powlekane ☐

Dovequa (rywaroksaban) 10 mg, tabletki powlekane ☐

Dovequa (rywaroksaban) 15 mg, tabletki powlekane ☐

Dovequa (rywaroksaban) 20 mg, tabletki powlekane ☐

- **Kartę należy zawsze przechowywać przy sobie**
- **Kartę należy pokazać przed leczeniem każdemu lekarzowi lub dentyście**

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Dovequa:

Imię i nazwisko:

Adres:

Data urodzenia:

Masa ciała:

Inne leki/choroby:

W nagłym przypadku należy powiadomić:

Imię i nazwisko lekarza:

Telefon lekarza:

Pieczątka lekarza:

Należy również powiadomić:

Imię i nazwisko:

Telefon:

Pokrewieństwo:

Informacja dla lekarza:

Nie należy stosować wskaźnika INR, ponieważ nie jest właściwy do pomiaru działania przeciwzakrzepowego leku Dovequa.

Co należy wiedzieć o leku Dovequa?

- Lek Dovequa rozrzedza krew, dzięki czemu zapobiega powstawaniu niebezpiecznych zakrzepów krwi.
- Lek Dovequa należy przyjmować dokładnie zgodnie z zaleceniami lekarza. W celu zapewnienia najlepszej ochrony przed powstaniem zakrzepów krwi, nigdy **nie należy pomijać dawki**.
- Nie wolno przerywać przyjmowania leku Dovequa bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, ponieważ ryzyko powstania zakrzepów krwi może się zwiększyć.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dovequa należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Należy poinformować lekarza, że przyjmuje się lek Dovequa przed każdą operacją lub zabiegiem inwazyjnym.

Kiedy należy zasięgnąć porady lekarza?

Podczas przyjmowania leków rozrzedzających krew, takich jak Dovequa, ważne jest, aby być świadomym możliwych działań niepożądanych. Krwawienie jest najczęstszym działaniem niepożądanym. Nie rozpoczynać przyjmowania leku Dovequa bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, jeśli wiadomo, że jest się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia krwawienia. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy krwawienia, takie jak:

- ból,
- obrzęk lub dyskomfort,
- ból głowy, zawroty głowy lub osłabienie,
- nadmierna skłonność do powstawania siniaków, krwawienia z nosa, krwawienia z dziąseł oraz ze skaleczeń, które nie ustają przez długi czas,
- krwawienie miesiączkowe lub krwawienie z pochwy o większym nasileniu niż normalnie,
- krew w moczu, która może dać różowe lub brązowe zabarwienie moczu, czerwone lub czarne zabarwienie stolca,
- odkrztuszanie krwi lub wymiotowanie krwią lub treścią przypominającą fusy od kawy.

Jak przyjmować lek Dovequa?

W celu zapewnienia optymalnej ochrony lek Dovequa

- 2,5 mg można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku,
- 10 mg można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku,
- 15 mg należy przyjmować z posiłkiem,
- 20 mg należy przyjmować z posiłkiem.