Karta dla pacjenta

Prubdaq (apiksaban)

Kartę należy zawsze mieć przy sobie/dziecku/opiekunie pacjenta.

Kartę należy pokazać farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego, przez rozpoczęciem leczenia.

Jestem poddawany(-a) leczeniu przeciwzakrzepowemu lekiem Prubdaq (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Proszę uzupełnić tę sekcje lub poprosić lekarza o jej wypełnienie:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Wskazanie:
Masa ciała:
Dawka: mg dwa razy na dobę
Imię i nazwisko lekarza:
Numer telefonu lekarza:

Informacja dla pacjentów/opiekunów pacjentów
- Przyjmuj/podawaj lek Prubdaq regularnie zgodnie z zaleceniami. W razie pominięcia dawki porannej, należy ją przyjąć/podać, jak najszybciej, dopuszczalne jest przyjęcie/podanie wraz z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano, a zamiast tego kontynuować przyjmowanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.
- Nie należy przerywać przyjmowania/podawania leku Prubdaq bez konsultacji z lekarzem, ponieważ u Ciebie/pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia udaru mózgu/zakrzepu lub innych powikłań.
- Lek Prubdaq pomaga w rozrzedzaniu krwi, ale może zwiększać ryzyko krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień obejmują zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bladość lub osłabienie, nagły silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoistnie, **natychmiast zasięgnij pomocy medycznej**.
- Jeżeli u pacjenta wystąpi konieczność poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub innemu zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu przez pacjenta leku Prubdaq.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego
- Prubdaq (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Lek Prubdaq może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Prubdaq nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagła operacja (nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)) – patrz ChPL.
- Dla dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowany przeciw czynnikowi Xa, jednak jego bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały potwierdzone w populacji pediatrycznej (patrz ChPL andeksanet alfa).